



# السّيْطَرَة على اللّفحة النّاريّة

# Maîtriser le feu bactérien



Distributeur



4 chemins 06000 Bejaia  
Tél : 034 22 28 25 - 0555 62 31 98/99  
Fax : 034 20 21 14  
Email : info@profert-dz.com  
www.profert-dz.com



Bayer Algérie SPA  
Lot 424-Coopérative El Bouroudj  
Ain Allah-Dely Ibrahim  
Phone: +213 21 91 08 23/ Fax: +213 21 91 08 93  
Web: www.algeria.bayercropscience.com

Région Est : R.MESTAR 0770 51 28 78  
R.OUADI 0770 32 86 32  
A.BENAICHA 0770 11 95 96  
Région Centre : S.SAAD 0770 30 68 13  
M.A. KACI 0770 32 40 47  
Région Ouest : T.TAIBI 0770 78 58 43  
M.A.BELBACHIR 0770 65 08 52  
Région Sud-Est : T.LEBKARA 0770 11 96 39



Science For A Better Life

### Le mode d'action :

• **Aliette® Flash** a une action préventive et curative sur de nombreux champignons phycomycètes, en bloquant la germination des spores ou la sporulation et le développement du mycélium

• **Aliette® Flash** stimule les défenses naturelles de la plante traitée

### Usages et doses

Culture	Cible	Dose	DAR*
Agrumes	Gommose	250 g/hL soit 2,5 kg/ha	15 jours
Fraisier	Mildiou	5 kg/ha	14 jours
Arbres fruitiers	Phytophthora	250 g/hL soit 2,5 kg/ha	21 jours
Cucurbitacées	Mildiou	250 g/hL soit 2,5 kg/ha	3 jours
Pommier et poirier	Feu bactérien	375 g/hL soit 3,75 kg/ha	21 jours

\* : Délai avant récolte  
En moyenne, le volume de bouillie est de :  
- 1000 L/ha en cultures pérennes  
- 400 à 600 L/ha en cultures maraichères



**Feu bactérien sur poirier**  
التلفحة البكتيرية على الإجاص



**Mildiou sur melon**  
ميلديو على البطيخ

### طريقة التأثير :

• يتمتع أليات® فلاش بنشاط وقائي و علاجي ضد العديد من الفطريات الطحلبية و ذلك بمنع تشكل و انتشار الأبواغ و نمو المشيج الفطري  
• يعمل أليات® فلاش على تحفيز الدفاعات الذاتية للنبات المداوى


### مقادير الاستعمال المسموحة

المحصول	الآفة	المقدار	م.ق.ج.*
الحمضيات	الفوموز	250 غ / هكتار أي 2,5 كغ/ هكتار	15 يوم
الفراولة	الميلديو	5 كغ / هكتار	14 يوم
الأشجار المثمرة	الفيتوفتورا	250 غ / هكتار أي 2,5 كغ/ هكتار	21 يوم
القرعيات	الميلديو	250 غ / هكتار أي 2,5 كغ/ هكتار	3 يوم
أشجار التفاح و الإجاص	التلفحة البكتيرية	375 غ / هكتار أي 3,75 كغ/ هكتار	21 يوم

\* مدة ما قبل الجني  
يتم تحظير العصيدة بمعدل :  
- 1000 ل/الهكتار على الأشجار المثمرة  
- 400 إلى 600 ل/الهكتار على الخضروات

### Avantages

- Excellente efficacité préventive et régulière
- Double systémie : ascendante et descendante
  - Forte mobilité dans la plante
  - Protection des nouvelles pousses
- Stimulation des défenses naturelles des plantes
- Absorption foliaire et racinaire
- Formulation WG sécurisée sans poussière et ultra dispersible
- Haute teneur en substance active pour une efficacité optimale
- Flexibilité d'utilisation :
  - Sous serres ou plein champ
  - Foliaire ou racinaire



### الفوائد

- حماية وقائية ممتازة و ثابتة المستوى
- جهازية مزدوجة : تصاعدية و تنازلية
- حركية عالية داخل النبتة
- حماية البراعم و الأوراق الجديدة
- تحفيز قدرات الدفاع الذاتية للنبات
- إمتصاص ممتاز عن طريق الأوراق و الجذور
- هيئة مؤمنة (WG) بدون غبار و عالية الإنحلال في الماء
- نسبة عالية من المادة الفعالة لتأثير ممتاز
- مرونة الإستعمال :
- داخل البيوت البلاستيكية و في الحقل
- على الأوراق أو عن طريق الجذور

### Recommandations pour feu bactérien (Erwinia amylovora)

- Traiter préventivement en période de floraison dès le stade D-D3 (apparition des boutons floraux)
- Si risque de contamination moyen, renouveler deux fois le traitement à une cadence de 10 jours
- Si risque élevé, la cadence de traitement doit être ramenée à 4 jours entre deux traitements successifs

### نصائح الإستعمال على التلفحة البكتيرية

- يجب تطبيق أليات® فلاش وقائياً خلال الإزهار : مرحلة ظهور براعم الزهور
- في حالة خطورة متوسطة، يجب تكرار المعالجة مرتين متباعدتين ب 10 أيام
- في حالة خطورة عالية، يجب تخفيض المدة بين علاجين متتاليين إلى 4 أيام